

1916 — N° 6

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE

DE FRANCE

FONDÉE LE 29 FÉVRIER 1832

RECONNUE COMME INSTITUTION D'UTILITÉ PUBLIQUE

PAR DÉCRET DU 23 AOÛT 1878

*Natura maxime miranda
in minimis.*



PARIS

AU SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

HOTEL DES SOCIÉTÉS SAVANTES

28, Rue Serpente, 28

1916

— Le Bulletin paraît deux fois par mois.

Librairie de la Société entomologique de France

Hôtel des Sociétés savantes, rue Serpente, 28

La Société dispose des ouvrages suivants :

(Le premier prix est pour les membres de la Société, le deuxième,
pour les personnes étrangères à la Société.)

Annales de la Société entomologique de France, années 1843 à 1845, 1859 à 1870, 1872 à 1879 et 1883 à 1895.	12 et 15 fr.
Annales (années 1896 à 1914).	25 et 30 fr.
Tables des Annales de la Société entomologique de France (1832-1860), par A.-S. PARIS.	2 et 3 fr.
Tables des Annales, de 1861 à 1880, par E. LEFÈVRE.	10 et 12 fr.
Tables des Annales, de 1881 à 1890, par E. LEFÈVRE.	7,50 et 10 fr.
Bulletin de la Société entomologique de France (publication distincte des Annales, depuis 1896), années 1896 à 1915, chaque année	18 fr.
Bulletin (numéros isolés), chaque.	1 et 1 fr.
Bulletin, comptes rendus du Congrès (1 ou plus. Nos).	5 et 5 fr.
L'Abeille (série in-12), la plupart des volumes, chacun.	8 et 12 fr.
L'Abeille (série in-8°), 1892-1906, prix de l'abonnement par volume (port compris).	10 et 12 fr.
Faune des Coléoptères du bassin de la Seine, par L. BEDEL :	
Vol. I (Carnivora, Palpicornia)	(Épuisé.)
Vol. II (Staphylinoidea, 1^{re} part.) (par S^{ie}-CLAIRE DEVILLE).	3 et 4 fr.
Vol. IV, 1^{er} fascicule (Scarabaeidae).	4 et 5 fr.
Vol. V (Phytophaga).	8 et 10 fr.
1 ^{er} fascicule seul.	3 et 4 fr.
2 ^e fascicule seul.	5 et 6 fr.
Vol. VI (Rhynchophora).	10 et 12 fr.
2 ^e fascicule seul.	5 et 6 fr.
Catalogue raisonné des Coléoptères du Nord de l'Afrique, par L. BEDEL, 1^{er} fasc., pp. 1-208, in-8°, 1895-1900.	10 et 12 fr.
<hr/>	
Synopsis des Onthophagides d'Afrique, par H. D'ORBIGNY	20 et 25 fr.
Les Zoocécidies du Nord de l'Afrique, par C. HOUARD.	8 et 10 fr.

EXTRAITS DE L'ABEILLE

Catalogue syn. et géogr. des Coléoptères de l'Anc. Monde, par S. DE MARSEUL, 1889, in-12, 1 vol. rel.	3 et 4 fr.
Catalogus Coleopterorum Europae et confinium, 1866, in-12.	0 fr. 50
Id. avec Index (Suppl. au Catalogus), 1877, in-12.	1 fr. 25
Les Entomologistes et leurs écrits, par DE MARSEUL, in-12.	8 et 10 fr.
Etude sur les Malachides d'Europe et du bassin de la Méditerranée, par PEYRON, 1877, in-12.	4 et 5 fr.
Mylabrides d'Europe (Monogr. des), par S. DE MARSEUL, 1870, in-12, 2 pl. :	
— Noires.	4 et 5 fr.
— Coloriées.	5 et 6 fr.

Librairie de la Société entomologique de France (suite).

<i>Silphides</i> (Précis des genres et espèces des), par S. DE MARSEUL, 1884, in-12.	3 et 4 fr.
<i>Tableaux synoptiques des Paussides, Clavigérides, Pselaphides et Scydmenides</i> , par REITTER (trad. E. Leprieur), 1883, in-12.	3 et 4 fr.
<i>Nouveau Répertoire contenant les descriptions des espèces de l'Ancien Monde</i> , par S. DE MARSEUL : <i>Hydrocanthares Palpicornes</i> , 1882, in-12.	3 et 4 fr.
<i>Buprestides</i> , 1889, in-12.	1 et 2 fr.
<i>Oedémérides</i> (Synopse des), par GANGLBAUER (traduction de Marseul), 1887, in-12.	1 et 2 fr.
<i>Ditomides</i> (Monogr. des), par P. DE LA BRULERIE, 1873, in-12.	2 et 3 fr.
<i>Eumolpides</i> (Synopse des), par E. LEFÈVRE (Appendice par DE MARSEUL), 1876, in-12.	1 et 2 fr.
<i>Histérides de l'Archipel malais et indo-chinois</i> , par S. DE MARSEUL, 98 p., 1864, in-12.	1 fr.
<i>Magdalinus d'Europe et circa</i> , par DESBROCHERS DES LOGES, 1870, in-12.	1 50 et 2 fr.
<i>Nanophyes</i> (Monogr. du genre), par H. BRISOUT DE BARNEVILLE, 1869, in-12.	1 50 et 2 fr.
<i>Erotylides et Endomychides de l'Ancien Monde</i> (Revision des), d'après les travaux de M. E. Reitter, 1889, in-12.	1 50 et 2 fr.
<i>Glaphyrus</i> (Monogr. du genre), par HAROLD (traduction A. Preud'homme de Borre), 1870, in-12.	0 fr. 50
<i>Oxyporus</i> (Tableau synopt. du genre), par A. FAUVEL, 1864, in-12.	0 fr. 50
<i>Malthinides de l'Ancien Monde</i> (Monogr. des), par S. DE MARSEUL, 120 p., 1877, in-12.	3 et 4 fr.
<i>Trichoptérygiens</i> (Synopse des espèces de), par MATTHEWS 75 p., 1878, in-12.	3 et 4 fr.
<i>Apionides</i> (Monographie des), par WENCKER, 162 p., 1864, in-12.	4 et 5 fr.
<i>Téléphorides</i> (Monographie des), par S. DE MARSEUL, 108 p., 1864, in-12.	3 et 4 fr.

EXTRAITS ET PUBLICATIONS DIVERSES

<i>Revision des Coléoptères de l'Ancien Monde alliés aux Stenosis</i> , par ED. REITTER, in-12, 50 p. (Extr. Gazette ent. Allem., XXX, 1866).	1 50 et 2 fr.
<i>Le genre Aëtophilus</i> , par V. SIGNORET, in-8°, 3 p., 1 pl. col. (Extr. Tijdschr. voor. Ent., vol. XXIII, 1879-80).	1 et 1 50

[Voir la suite à la page 6 de la couverture.]

AVIS TRÈS IMPORTANTS

Annales. — Le 3^e trimestre des *Annales* de 1915 a paru.

L'Abeille. — Le 4^e fascicule du vol. XXXI a paru le 22 avril 1914.

Le Trésorier rappelle que le 3^e trimestre des *Annales* de 1915, qui vient de paraître, ne sera envoyé qu'aux membres de la Société qui auront payé la cotisation de l'année. Il prie donc ses collègues de se mettre en règle le plus tôt possible, en lui faisant parvenir leur cotisation.

Il est à leur disposition pour la recevoir tous les jours de semaine de 10 h. à midi, 17, quai Voltaire, Paris, VII^e, et à toutes les séances de la Société, 28, rue Serpente.

Les envois peuvent lui être faits soit à son domicile, 2, rue de La Planche, Paris, VII^e, soit au siège de la Société.

Tous les envois d'argent faits à la Société par lettres chargées, mandats-poste ou chèques payables à Paris, doivent être libellés au nom de M. Ch. Lahaussais, Trésorier, et non autrement, pour éviter les difficultés d'encaissement d'envois impersonnels.

Avis. — La Bibliothèque de la Société est ouverte : pour renseignements, tous les jours, de 4 h. 1/2 à 6 h. 1/2; pour y travailler : les mardis, jeudis, samedis, de 3 h. à 6 h. 1/2, et les mercredis, de 8 h. à 10 h. 1/2 du soir.

PRÉPARATION D'INSECTES DE TOUS ORDRES

Étalage soigné de Lépidoptères, etc. Entretien de collections et soufflage de chenilles.

M^{lle} C. Bleuse, 29, rue Lacépède, Paris (V^e).

Envoi du tarif sur demande.

BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 22 mars 1916.

Présidence de M. J. DE JOANNIS.

M. Ch. DEMAISON, de Reims, assiste à la séance.

Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Nous avons reçu de bonnes nouvelles de MM. le D^r L. BAROS et A. GERVAIS D'ALDIN.

Nous avons eu le plaisir de voir, à Paris même, M. R. LEY.

Admission. — M. Claude PIERRE, dessinateur, 7 bis, rue du Loing, Paris, 14^e. — *Diptères.*

Prix Dollfus 1915 (vote). — Conformément aux articles 14 et 63 de son Règlement, la Société procède au vote sur les conclusions du rapport de la Commission du prix Dollfus, rapport inséré au *Bulletin*, [1916], n^o 2, p. 66.

Quarante-cinq membres prennent part au vote, soit directement, soit par correspondance. Ce sont MM. :

J. ACHARD, — Ch. ALLUAUD, — E. BARTHE, — A. BAYARD, — L. BEDEL, — E. BORDAGE, — A. BOURGOIN, — E. L. BOUVIER, — L. CHOPARD, — J. CLERMONT, — P. DAGUIN, — Ch. DEMAISON, — L. DEMAISON, — H. DESBORDES, — H. DONCKIER DE DONCEEL, — H. DU BUYSSON, — P. ESTIOT, — L. FALCOZ, — Ch. FERTON, — H. GADEAU DE KERVILLE, — J. DE GAULLE, — H. GELIN, — A. GROUVELLE, — J. GROUVELLE, — Ph. GROUVELLE, — F. GRUARDET, — E. HOLL, — A. HUSTACHE, — J. DE JOANNIS, — Ch. LAHAUSOIS, — R. LÉON-DUFOUR, — P. LESNE, — P. MABILLE, — J. MAGNIN, — R. MOLLANDIN DE BOISSY, — E. MOREAU,

Bull. Soc. ent. Fr., [1916].

N^o 6

— P. NICOD, — J. PANTEL, — R. PESCHET, — P. DE PEYERIMHOFF,
— M. PIC, — V. PLANET, — Ét. RABAUD, — J. SAINTE-CLAIRE DEVILLE,
— G. SEURAT.

Le dépouillement des votes donne le résultat suivant :

Jean CHATANAY..... 45 voix.

En conséquence, Jean CHATANAY, tué à l'ennemi, est proclamé, à l'unanimité des voix, lauréat du prix Dollfus pour l'année 1915.

Observations diverses.

Captures en Corse [LEP. et HEM.]. — M. J. de JOANNIS communique les observations suivantes faites par M. l'abbé H. DE ROSSI, curé à Mesnil-Panneville (Seine-Inférieure), au cours d'un voyage en Corse :

1^o Le 3 mai 1915, *Papilio Hospiton* Géné volait en abondance (par centaines) dans les Agriades, région près de St-Florent, où les éminences les plus élevées n'atteignent pas 400 mètres; ces insectes voltigeaient jusque sur les rochers au bord de la mer. Il ne semble pas que l'on ait encore indiqué la capture de ce *Papilio* à d'aussi faibles altitudes. Le Dr R. VERITY indique : de 600 m. à 1.200 m. Le C^{te} TURATI indique, pour la Sardaigne, 800 m.; il indique bien, une autre fois, « jusqu'à 800 m. », mais la limite inférieure n'est pas précisée. Les pieds de *Ferula* étaient nombreux dans la région mentionnée ci-dessus.

2^o Le bel Hémiptère *Solenostethium lynceum* F. a été pris en octobre, uniquement sur les Arbousiers, à Ogliastro (cap Corse). Cet insecte a été signalé dans la région méditerranéenne, Baléares, Algérie, etc., mais ne semble pas avoir jamais été cité authentiquement de Corse.

Communications.

Note sur un Carabe à huit pieds [COL.]

par Ch. ALLUAUD.

Dans un récent envoi de Coléoptères que M. l'abbé H. BREUIL, l'éminent professeur à l'Institut de Paléontologie humaine, a bien voulu recueillir à mon intention en Andalousie, figure un *Carabus Dufouri* Dej. ♀, pris à Bobadilla le 27 février 1916 et qui présente huit tibias et huit tarses parfaitement conformés.

La monstruosité porte sur la patte médiane droite, dont le fémur, normalement articulé avec la hanche, s'élargit considérablement et

porte à son extrémité distale trois tibias semblables et normaux suivis de tarses également normaux. Les trois tibias sont articulés sur le fémur monstrueux. Deux des tarses ont été brisés accidentellement et, sur la figure ci-jointe, j'ai indiqué en pointillé les articles absents. Comme ce Carabe, qui a été pris vivant, est par ailleurs absolument complet et parvenu à son parfait développement, je crois pouvoir émettre l'hypothèse que c'est l'insecte lui-même qui s'est amputé, au moyen de ses mandibules, les articles qui manquent aux deux tarses surnuméraires et qui constituaient une gêne pour sa marche, mais qu'il s'est bien gardé de mutiler le troisième tarse qui, si ma supposition est exacte, représenterait le tarse médian normal.




Fig. 1. — Patte médiane droite.

Il est toutefois à noter que ce dernier a ses articles un peu plus courts que ceux du tarse de la patte médiane gauche.

La cuisse monstrueuse, dans sa partie élargie, a l'épaisseur de trois fémurs soudés intimement ensemble, mais cette structure n'a entraîné aucune modification de la hanche, ni du trochanter, ni des pièces sternales voisines.

Description d'un *Hister* nouveau du sous-genre

Peranus Lew. (*Atholister* Reitt.)

et tableau des espèces de ce sous-genre [COL. HISTERIDAE]

par H. DESBORDES.

Hister (subg. *Peranus* Lew.) **chariensis**, n. sp. — *Ovalis, convexus, niger, nitidus. Frons plana, stria retrorsum acuminata, mandibulis planis. Pronotum ad angulos anticos foveolatum, stria laterali crenulata, antice integra, ad basim abbreviata. Elytrorum striae fortes, subhumerali interna humerum attingente, dorsalibus 1-5 integris, 5^a ad basim incurvata, suturali antice parum abbreviata. Propygidium pygidiumque raris et levibus punctis notata. Mesosternum subsinuatum, stria integra. Tibiae anticae quinque vel sexdenticulatae, ultimo dente validiusculo.* — Long. 4-4,5 mm.

Types : 4 exemplaires provenant de Fort-Sibut (Haut Chari, Congo français). Coll. DESBORDES et Muséum de Paris.

Cette espèce forme, avec l'*Hister depistor* Mars., du Japon, un petit groupe qui se sépare nettement des autres espèces du sous-genre *Peranus* par la présence sur les élytres d'une strie subhumérale interne forte et crénelée, tout à fait semblable à celle qu'on remarque chez les *Hister* des 2^e et 3^e groupes (classification de MARSEUL). *H. depistor* et *H. chariensis*, bien que voisins, sont d'ailleurs nettement différents l'un de l'autre, comme on peut le voir dans le tableau qui suit :

TABLEAU DES *Hister* DU SOUS-GENRE *Peranus* LEW.

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Front fovéolé, ou au moins avec une dépression sensible.
Strie subhumérale interne des élytres nulle ou obsolète. | 2. |
| — Front plan, sans fovéole ni dépression. Strie subhumérale interne des élytres atteignant l'épaule, bien marquée. — Élytres noirs, à cinq stries dorsales entières, la suturale plus ou moins longue..... | 5. |
| 2. Quatre premières stries dorsales des élytres entières, cinquième apicale courte, suturale réduite à une trace ou nulle. — Tibias antérieurs à 3 dents. — Long. 5,5-6 mm. ⁽¹⁾ | <i>Maindroni</i> Lew. |
| (Inde : Kurrachee). | |
| — Cinq premières stries dorsales des élytres entières ; suturale plus ou moins longue, mais toujours visible..... | 3. |
| 3. Ponctuation du propygidium et celle du pygidium (au moins à la base) espacée, mais forte. Mésosternum manifestement sinué en avant. Tibias antérieurs à 3 dents. — Long. 5-7 mm..... | 4. |
| — Ponctuation du propygidium superficielle et très espacée, celle du pygidium encore plus fine, à peine visible. Mésosternum droit en avant. Tibias antérieurs à 4 dents. — Front avec une dépression légère. Élytres soit rouges avec une grande tache scutellaire triangulaire noire, soit presque entièrement noirs (var. <i>morio</i> J. Schmidt). — Long. 3,25-4 mm..... | <i>bimaculatus</i> L. |
| (Espèce très répandue, presque cosmopolite). | |

(1) L'*Hister Maindroni*, dont le facies rappelle celui de l'*Hister Daldorffi* Bed., a, comme ce dernier, les élytres tantôt entièrement noirs, tantôt tachés de rouge ; mais cette dernière forme, chez *H. Maindroni*, se rencontre plus rarement que l'autre, tandis que, chez *H. Daldorffi*, c'est la forme à élytres tout noirs qui est la moins répandue.

4. Élytres avec une courte strie subhumérale externe vers l'épaule, rouges avec une tache suturale noire mal limitée, ou entièrement noirs (var. *lentus* Mars.)..... *scutellaris* Er. (Sicile, Corfou, Asie Mineure, Basse-Égypte; la var. *lentus* aussi en Guinée portugaise).
- Élytres sans strie subhumérale externe, noirs avec une tache ovalaire rouge, rarement entièrement noirs. — (*bipustulatus* || F., non Schrank)..... *Daldorffi* Bed. (Inde, Birmanie, Ceylan).
5. Propygidium et pygidium fortement, parfois même grossièrement ponctués. Tibias antérieurs à 4 dents. — Long. 3-5 mm..... *depistor* Mars. (Japon).
- Propygidium et pygidium, ce dernier surtout, finement et éparquement ponctués. Tibias antérieurs à 5 ou 6 denticules. — Long. 4-4,5 mm..... *chariensis* Desb. (Haut Chari : Fort-Sibut).

Nouveaux *Zonabris* de l'Inde et de Cochinchine [COL. LYTTIDAE]

par Maurice PIC.

Zonabris madrasensis, n. sp. — *Parum nitida, obscuro pubescens, nigra, elytris testaceis, signaturis nigris ornatis* (*macula praescutellari, macula posthumerali, fascia media transversa, fascia apicali*).

Peu brillant, médiocrement large, à pubescence d'un gris obscur en partie redressée en avant; noir; élytres testacés, ornés chacun des dessins noirs suivants : une macule transversale basale préscutellaire, une macule subtransversale, assez grosse, discale, placée en dessous des épaule, une fascie médiane large, ondulée, une fascie apicale assez étroite, sinuée en avant. Antennes nettement épaissies à l'extrémité, à dernier article épais, un peu rétréci au sommet. Tête large, à peu près ponctuée comme le prothorax. Celui-ci rétréci en avant, irrégulièrement impressionné sur le disque. Élytres bien plus larges que le prothorax, densément plissés-ponctués, plus finement sur les parties noires que sur les parties testacées, avec des traces de deux côtes discales sur chacun. Éperons des tibias postérieurs spiniformes. — Long. 15 mm.

Inde : Madras (coll. PIC).

Cette espèce, remarquable par le dessin noir de ses élytres, peut se placer près de *Z. tiflensis* Billb.

Zonabris bipartiticornis, n. sp. — *Parum nitida, griseo pubescens et obscure hirsuta, nigra, antennarum articulis sex ultimis testaceis, elytris nigris, antice rufo bimaculatis et post medium rufo fasciatis.*

Peu brillant, médiocrement large, orné d'une pubescence grise couchée avec quelques poils obscurs dressés sur l'avant-corps et sur la base des élytres, noir, avec les six derniers articles des antennes testacés et les élytres noirs, ornés chacun de deux macules basales arrondies et de deux fascies peu sinuées, une avant, l'autre après le milieu; celles-ci rousses. Antennes un peu épaissies à l'extrémité, à dernier article non épaissi, subacuminé. Tête un peu moins densément ponctuée que le prothorax. Celui-ci court, rétréci en avant, irrégulièrement impressionné sur le disque. Élytres bien plus larges que le prothorax, densément plissés-ponctués, plus finement sur les parties noires que sur les parties rousses, avec les traces de 2 côtes discales sur chacun. Éperons des tibias postérieurs spiniformes. — Long. 17 mm.

Inde : Ramnad (coll. Pic).

Cette espèce, voisine de *Z. pustulata* Thunb., s'en distingue, à première vue, par ses antennes bicolores.

Zonabris parvula var. **Lajoyei**, n. var. — *Signaturis anticis nigris elytrorum interruptis.*

La fascie basale noire, ondulée et arquée, qui existe chez la forme type, est, chez cette variété, disjointe en son milieu et formée, sur chaque élytre, d'une macule interne isolée, subarrondie, d'une ligne allongée, humérale, bifurquée postérieurement; en outre, la fascie médiane noire est complète.

Cochinchine : cap St-Jacques (coll. Pic).

Une aberration nouvelle d'*Erebia aethiops* Herbst

[LEP. SATYRIDAE]

par A.-L. CLÉMENT.

Erebia aethiops ab. **Royi**, n. aberr. — En dessus, la bande ferrugineuse des ailes supérieures est assez large, mais sans traces de taches ocellées (tandis que, chez le type, il y a quatre taches ocellées, noires, avec un point blanc au centre). La bande des ailes inférieures, plus

foncée que celle des supérieures et vaguement interrompue, présente trois petites taches ocellées (les individus typiques en ont ordinairement quatre, mais assez souvent trois seulement).

En dessous, il ne subsiste, sur les ailes inférieures, qu'une seule tache ocellée, extrêmement petite, située entre les nervures 2 et 3, sur le bord externe de la bande claire.

Enverg. : 42 mm.

Cette remarquable aberration est dédiée à M. BEHERMANN-ROY, qui l'a capturée à Norvaux, canton d'Amancey (Doubs), le 28 août 1898, à 440 m. d'alt., en compagnie d'*Erebia aethiops* typiques, très abondants au même endroit.



E. aethiops ab. *Royi*, n. ab.

Bulletin bibliographique.

BERGEVIN (E. DE) : A propos de la capture, nouvelle pour l'Algérie, de *Pseudoloxops coccinea* Mey. (Bull. Soc. Hist. nat. Afr. N. [1915], p. 156-157.)*

ID. : Description d'une nouvelle espèce de *Chanitus* Klti (Hém.) du Maroc sud-occidental. — Note sur le genre *Dimorphocoris* Reut. (loc. cit. [1916], p. 61-62 et p. 42-45), fig.*

BERLESE (A.) et PAOLI (G.) : Un endofago esotico efficace contro il *Chrysomphalus dictyospermi* Morg. (Redia, XI [1916], p. 305-307), fig.*

DEMAISON (L.) : Académie de Reims. Séance tenue à Paris, le 10 décembre 1915. Allocution de M. L. Demaison, Président; 11 p.*

ORBIGNY (H. D') : Synopsis des Onthophagides d'Afrique. (Ann. Soc. ent. Fr. [1913], p. 1-742). — Don de M^{me} Henri d'Orbigny.

ID. : Supplément au Synopsis des Onthophagides d'Afrique. (Ann. Soc. ent. Fr. [1915], p. 375-401). — Id.

ORCHYMONT (A. D') : Contribution à l'étude des larves hydrophilides. (Ann. Biol. lacustre, Bruxelles, [1913], p. 173-214, fig. 1-23.*

ORCHYMONT (A. D') : Einige Bemerkungen über die äussere Morphologie der Hydrophiliden (Col.). (*Entom. Mittheil.*, Berlin, II [1913], p. 101-106, fig. 1-8.*

Id. : H. Sauter's Formosa-Ausbeute : Hydrophilidae (Col.). (*Suppl. Entom.*, Berlin, [1913], n° 2, p. 1-18, 1 pl.).*

Academy of Naturel Sciences of Philadelphia (Journal of the), 2, XVI [1914]. — BRAUN (A. F.) : Evolution of the colour pattern in the microlepidopterous genus *Lithocolletis*, p. 105-166, pl. 3-4.

Canadian Entomologist (The), XLVIII [1916]. — BRITAIN (W. H.) et GOODERHAM (C. B.) : An insect enemy of the parsnip; p. 37, fig., pl. 2. — ALEXANDER (C. P.) : New nearctic craneflies (Tipulidae), p. 42. — COCKERELL (T. D. A.) : The bees of the Coronado islands; p. 54. — DOD (F. H. W.) : Noctuid notes from Western Canada, with descriptions of two new species and a variety; p. 58, pl. 3-4. — CASEY (T. L.) : A new species of *Baryodma*; p. 71. — FRENCH (G. H.) : A new species of *Catocala*; p. 72.

Entomological News, XXVII [1916]. — WALCOTT (R. H.) : Description of two hitherto undescribed aberrations, the one of *Argynnis alcestis*, the other of *Chlorippe celtis*; p. 97, pl. 4, fig. 5-6. — LEUSSLER (R. A.) : A new variety of *Satyroides canthus* from Nebraska; p. 99; pl. 4, fig. 1-4. — DIETZ (H. F.) et MORRISON (H.) : *Phenacaspis spinicola*, n. sp.; an apparently new coccid from Indiana; p. 101, fig. — PARSHLEY (H. M.) : New and noteworthy Hemiptera from England; p. 103, fig. — HOOD (J. D.) : A new species of *Heterothrips* (Thys.) from Eastern United States; p. 106. — WEISS (H. B.) : Additional records of New Jersey Acarina; p. 109. — SMITH (R. M.) et MORRISON (W. A.) : South Carolina ants (Hym.); p. 110. — JOHNSON (H. L.) : Additions to the Coleoptera of Meriden, Connecticut; p. 112. — SLOSSON (A. T.) : Connecticut Coleoptera; p. 125. — WATSON (J. R.) : New Thysanoptera from Florida; p. 126, pl. 5-6. — MC ATEE (W. L.) : Curious behavior of *Cicindela unipunctata* (Col. Cicindelidae; Hym. Formicidae); p. 135. — YANCEY (J. D.) : *Vanessa californica* and frost; p. 136. — SMYTH (E. A.) : Color phases in *Argynnis Diana*; p. 136.

A. B.

Le Secrétaire-gérant : L. CHOPARD.

ANNONCES DE LA SOCIÉTÉ

VOYAGE DE CH. ALLUAUD ET R. JEANNEL en Afrique Orientale (1911-1912)

Mémoires parus :

- Liste des Stations** : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL, avec une carte.
- Grottes de l'Afrique Orientale** : par Ch. ALLUAUD et R. JEANNEL.
- Crustacés** : I, *Phyllopoda*, par E. DADAY DE DEËS. — II, *Amphipoda*, par E. CHEVREUX.
- Arachnides** : I, *Opiliones*, par le Dr C.-Fr. ROEWER, avec 1 pl. n. — II, *Ixodidae*, par L.-G. NEUMANN. — III, *Araneae* (1^{re} partie), par L. BERLAND.
- Hémiptères** : I, *Pentatomidae*, par le Dr R. JEANNEL, avec 4 pl. n. — II, *Naucoridae*, *Belostomidae* et *Nepidae*, par A.-L. MONTANDON.
- Strepsiptères** : par le Dr R. JAENNEL, avec 1 pl. n.
- Coléoptères** : I, *Pselaphidae*, par A. RAFFRAY. — II, *Onthophagini*, par H. D'ORBIGNY. — III, *Meloidae*, par M. PIC, avec 1 pl. col. — IV, *Hylophilidae* et *Anthicidae*, par M. PIC, avec 1 pl. n. — V, *Hybosorinae*, etc., par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n. — VI, *Buprestidae*, par Ch. KERREMANS, avec 1 pl. col. — VII, *Lampyridae*, par E. OLIVIER. — VIII, *Hispinae*, par R. GESTRO, avec 1 pl. n. — IX, *Dascillidae*, etc., par M. PIC. — X, *Anthribidae*, par K. JORDAN. — XI, *Histeridae*, par H. DESBORDES. — XII, *Dynastinae*, par E. BENDERITTER, avec 1 pl. n.
- Hyménoptères** : I, *Proctotrupidae*, *Cynipidae*; etc., par J.-J. KIEFFER. — II, *Formicidae*, par le Dr F. SANTSCHI, avec 2 pl. n. — III, *Chrysididae* et *Vespidae*, par R. DU BUYSSON. — IV, *Bracconidae*, par Gy. SZÉPLIGETI.
- Diptères** : I, *Chironomidae* et *Cecidomyiidae*, par J.-J. KIEFFER. — II, *Nematocera*, par F.-W. EDWARDS. — III, *Polyneura*, par P. RIEDEL. — IV, *Anthomyiidae*, par P. STEIN. — V, *Brachycera*, par Th. BECKER, avec 2 pl. n.
- Lépidoptères** : I, *Chenilles des galles*, par F. LE CERF, avec 2 pl. n.
- Orthoptères** : I, *Dermaptera*, par A. BORELLI, avec 2 pl. n. — II, *Mantidae*, par L. CHOPARD.
- Pseudonévroptères** : I, *Termitidae*, par V. SJÖSTEDT. — II, *Odonata*, par R. MARTIN, avec 3 pl. n.
- Névroptères** : *Planipennia*, etc., par L. NAVÁS.
- Myriapodes** : I, *Chilopoda*, par H. RIBAUT, avec 5 pl. n. — II, *Symphyla*, par H. RIBAUT, avec 2 pl. n.
- Plancton du Victoria-Nyanza**, par J. VIRIEUX, avec 2 pl. n.
- Vers** : *Turbellariés*, *Trématodes* et *Gordiacés*, par P. DE BEAUCHAMP, avec 1 pl. n. — II, *Oligochètes*, par MICHAELSEN, avec 1 pl. n.
- Poissons du Victoria-Nyanza**, par le Dr J. PELLEGRIN, avec 1 pl. n.

Pour tous renseignements concernant cette publication s'adresser, provisoirement, à M. Ch. ALLUAUD, rue du Dragon, n° 3, Paris (VI^e).

Librairie de la Société entomologique de France (suite).

<i>Characters of undescribed Lepidoptera heterocera</i> , par F. WALKER. London, 1869, in-8°	3 et 4 fr.
<i>Tableaux analytiques pour déterminer les Coléoptères d'Europe</i> , in-8°, Moulins. (Extr. Rev. sc. Bourb.) :	
I. <i>Nécrophages</i> , traduit de REITTER [par M.-J. BELON], 1890.	1 fr.
II. <i>Colydiides, Rhysodides, Trogoitides</i> (traduit de REITTER), 1891.	0 fr. 50
<i>Histériides nouveaux (Description d')</i> , par S. DE MARSEUL, in-8° (Extr. Ann. Soc. ent. Belg.).	1 50 et 2 fr.
<i>Monographie de la famille des Eucnémides</i> , par H. DE BONVOULOIR, Paris, Soc. ent. Fr., in-8° avec 42 planches gravées.	5 et 7 fr.
<i>Essai sur la classification des Pyralites</i> , par E.-L. RAGONOT, in-8°, 276 p., 4 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1890).	10 et 12 fr.
<i>Le même</i> , pl. noires.	4 et 6 fr.
<i>Nouveaux genres et espèces de Phycitinae et Galleriidae</i> , par E.-L. RAGONOT, in-8°, 52 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1888).	3 et 4 fr.
<i>Notes synonymiques sur les Microlépidoptères et description d'espèces peu connues ou inédites</i> , par E. L. RAGONOT, in-8°, 66 p., 1 pl. color. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1894).	4 et 5 fr.
<i>Microlépidoptères de la Haute Syrie récoltes par M. Ch. Delagrange</i> , par E.-L. RAGONOT, in-8°, 15 p. (Extr. Ann. Soc. ent. Fr. 1895).	1 50 et 2 fr.
<i>Diagnoses of North American Phycitidae and Galleriidae</i> , by E.-L. RAGONOT, Paris, 1887, in-8°, 20 p.	1 50 et 2 fr.
<i>Revision of British species of Phycitidae and Galleriidae</i> , by E.-L. RAGONOT, in-8°, 58 p.	2 fr. et 2 50
<i>Catalogue des Phycitinae</i> , par E.-L. RAGONOT, in-4°, 52 p. (Extr. de la Monogr. des Phycitinae, 1893) S. l. n. d.	5 et 6 fr.
<i>Genera et Catalogue des Psélaphides</i> , par A. RAFFRAY, in-8°, 621 p., 3 pl. (Extr. des Ann. Soc. ent. Fr., 1903).	20 et 25 fr.

Pour les *Membres* de la Société, les offres d'échanges, demandes de communications ou de renseignements d'ordre *purement scientifique*, qui n'excéderont pas *cinq* lignes, seront insérées *gratuitement* dans deux numéros; lorsque ces offres ou demandes n'excéderont pas *dix* lignes, elles coûteront 0 fr. 20 la ligne pour deux numéros.

La Société entomologique de France tient ses séances les 2^e et 4^e mercredis de chaque mois (excepté août et septembre), à 8 h. 1/2 du soir, au siège social, Hôtel des Sociétés savantes, 28, rue Serpente.

Elle publie :

1^o Les Annales de la Société entomologique de France (4 fascicules par an avec planches et figures);

2^o Le Bulletin de la Société entomologique de France (21 numéros par an avec figures).

Les Membres résidant en France, dans les pays de protectorat ou les colonies françaises, paient une cotisation annuelle de 25 fr.

Les Membres résidant à l'Étranger paient. 26 fr.

La Société admet des assistants (entomologistes âgés de moins de 21 ans) qui paient une cotisation annuelle de 5 fr.

Tout Membre payant une somme de 300 francs est nommé Membre à vie. Il n'a plus de cotisation à payer, reçoit *franco* les *Annales*, le *Bulletin*, et, à titre de prime gratuite, une série de dix volumes des *Annales* parmi ceux à prix réduit restant encore en magasin.

Ce versement de 300 francs peut s'effectuer par fractions annuelles et consécutives d'au moins 100 francs.

La Bibliothèque (28, rue Serpente) est ouverte aux Sociétaires les *mardis*, *jeudis* et *samedis*, de 3 heures à 6 heures 1/2; le *mercredi*, de 8 à 10 heures 1/2 du soir.

PROPRIÉTÉS DE LA SOCIÉTÉ

L'ABEILLE, Journal d'Entomologie, fondé par S. DE MARSEUL, continué par la Société entomologique de France, publie spécialement des travaux sur les COLÉOPTÈRES de l'Ancien Monde.

M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon, est chargé de la publication du Journal (*examen et admission des mémoires et correspondance scientifique*).

Le montant des abonnements *L'Abeille* (à 10 fr. ou 12 fr. par volume) doit être adressé à M. J. MAGNIN, Bibliothécaire adjoint de la Société entomologique, 28, rue Serpente.

COLLECTIONS

Collection H. Sénac (*Tenebrionidae paléarctiques*),

Collection Ch. Brisout de Barneville (*Coléoptères paléarctiques*),

Collection Vauloger (*Anthicidae, Matalachidae, Erodididae*),

chez M. L. BEDEL, 20, rue de l'Odéon;

Collection H. de Peyerimhoff (*Microlépidoptères*),

Collection H. Brisout de Barneville (*Coléoptères d'Europe*),

Collection Aubé (*Coléoptères paléarctiques*),

Collection Capiomont (*Hyperidae, Lixus, Larinus*),

Collection Vauloger (*Helopidae*).

Collection complète des Orthoptères de France, don Finot,

Collection d'Hémiptères de France, don Fairmaire,

Collection Pandellé (*Diptères de France*),

Collection de Diptères de France, don de M. le D^r Gobert,

Collection A. Cheux (*Lépidoptères de France*),

Collection entomologique française de tous les ordres,

Collection d'exemplaires typiques,

au Siège social, 28, rue Serpente.

SOMMAIRE DU N° 6

Séance du 22 mars 1916

<i>Nouvelles de nos collègues aux Armées. — Admission. — Prix Dollfus 1915 (vote).</i>	121
--	-----

Observations diverses.

<i>Captures en Corse</i> [LEP. et HEM.]	122
---	-----

COMMUNICATIONS

CH. ALLUAUD. — Note sur un Carabe octopode [COL.], fig.	122
H. DESBORDES. — Description d'un <i>Hister</i> nouveau du sous-genre <i>Peranus</i> Le w. (<i>Atholister</i> Reitt.) et tableau des espèces de ce sous-genre [COL. HISTERIDAE].	123
M. PIC. — Nouveaux <i>Zonabris</i> de l'Inde et de Cochinchine [COL. LYTTIDAE].	125
A.-L. CLÉMENT. — Une aberration nouvelle d' <i>Erebia acthiops</i> Herbst [LEP. SATYRIDAE], fig.	126

<i>Bulletin bibliographique.</i>	127
--	-----

Pour la *correspondance scientifique*, les *réclamations* et les *annonces*
s'adresser à :

M. le Secrétaire de la Société entomologique de France
28, rue Serpente, Paris, 6^e.